

FATO
FAKE

FATO ou **FAKE?**



1

**SEXO ORAL SEM
CAMISINHA É UM
COMPORTAMENTO
DE RISCO PARA
CONTRAIR ISTs**

FATO ou FAKE?

2

**ISTs SEMPRE
APRESENTAM
SINTOMAS**

FATO ou FAKE?

3

**SEXO LÉSBICO SEM
CAMISINHA NÃO
REPRESENTA
RISCOS PARA
CONTRAIR ISTs**

FATO ou FAKE?

4

**NÃO HÁ RISCO DE
CONTRAIR ISTs
ATRAVÉS DO SEXO
ANAL
DESPROTEGIDO**

FATO ou FAKE?



FATO ou **FAKE?**



5

**É MELHOR NÃO
ESCOVAR OS
DENTES ANTES
DO SEXO ORAL**

FATO ou FAKE?

6

**LIMPAR
UTENSÍLIOS
CORTANTES COM
ÁLCOOL ELIMINA
OS AGENTES
CAUSADORES DE
ISTs**

FATO ou FAKE?

7

**VOCÊ CERTAMENTE
SE CONTAMINARÁ
SE TIVER UMA
RELAÇÃO SEXUAL
COM UMA PESSOA
SOROPOSITIVA**

FATO ou FAKE?

8

**SÓ É POSSÍVEL SE
INFECTAR COM
ISTs SE
ACONTECER
PENETRAÇÃO
DURANTE O SEXO**

FATO ou FAKE?



FATO ou **FAKE?**



9

**TRANSAR SEM
CAMISINHA É UM
COMPORTAMENTO
DE ALTO RISCO DE
INFECÇÃO DE ISTs**

FATO ou FAKE?

10

**DEPOIS DE TRANSAR
SEM CAMISINHA
NÃO HÁ MAIS O QUE
SER FEITO PARA
EVITAR A
CONTRAÇÃO DE ISTs**

FATO ou FAKE?

11

**TRANSAR SEM
CAMISINHA COM
UM ÚNICO
PARCEIRO/A
PREVINE A
CONTRAÇÃO DE
ISTs**

FATO ou FAKE?

12

**SE ESTIVER
USANDO PREP
NÃO PRECISO
MAIS USAR
CAMISINHA**

FATO ou FAKE?



FATO ou **FAKE?**



13

**SENTAR NA
PRIVADA DE UM
BANHEIRO
PÚBLICO É UM
RISCO PARA
CONTRAIR ISTs**

FATO ou FAKE?

14

**SEXO SEM
LUBRIFICANTE
PODE AUMENTAR O
RISCO DE
TRANSMISSÃO DE
ISTs**

FATO ou FAKE?

15

**FAZER SEXO SOB EFEITO
DE ÁLCOOL E/OU OUTRAS
DROGAS PODE SER
CONSIDERADO UM
COMPORTAMENTO DE
RISCO PARA CONTRAÇÃO
DE ISTs**

FATO ou FAKE?

16

**SE O PÊNIS É
RETIRADO ANTES
DA EJACULAÇÃO
NÃO HÁ RISCO DE
CONTÁGIO**

FATO ou FAKE?



FATO ou **FAKE**?



1

FATO

O sexo oral sem preservativos facilita o surgimento de ISTs, devido ao contato entre a mucosa da boca e as secreções vindas dos órgãos sexuais.

2

FAKE

Algumas ISTs são às vezes silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas, como a clamídia e o HPV. Por isso, é importante fazer exames laboratoriais com certa frequência, principalmente após a exposição em relação sexual desprotegida.

3

FAKE

Durante o sexo lésbico pode haver a transmissão de ISTs através do contato da pele e mucosas, troca de sangue e fluídos ou compartilhamento de acessórios.

4

FAKE

Grande parte das ISTs são contraídas pelo sexo anal desprotegido, em especial o HIV.



FATO ou FAKE?



5

FATO

A limpeza completa da boca pode gerar fissuras e aumentar as chances de contato sanguíneo direto.

6

FATO

É importante que seja consultado o tempo de higiene e as quantidades de vezes de exposição ao produto para uma higienização completa.

7

FAKE

Pessoas soropositivas em tratamento podem estar indetectáveis, com carga viral tão baixa que não transmitem para outras pessoas. Se estiver em uso do PreP, também estará protegida contra o HIV.

8

FAKE

O risco de transmissão do HIV pelo sexo oral sem proteção existe, mas é baixo. Contudo, é importante saber que inúmeras outras infecções sexualmente transmissíveis podem ser adquiridas pelo sexo oral. A existência de uma outra IST (visível ou não) também pode aumentar o risco de infecção.

No caso de sexo oral em um pênis, recomenda-se utilizar o preservativo. A chance de contrair o HIV aumenta em caso de ejaculação na boca.

No caso da prática do sexo oral em uma vagina, os riscos podem aumentar se a pessoa receptora do sexo oral estiver menstruada. Uma das opções de prevenção ao fazer sexo oral em uma vagina é utilizar o papel filme, ou até mesmo uma camisinha cortada como forma de barreira física entre a vagina e a boca. (UNIAIDS)



FATO ou FAKE?



9

FATO

O preservativo - masculino ou feminino - é a medida mais eficaz de prevenção de infecção de ISTs, portanto seu uso é recomendado para todas as práticas sexuais. Ele pode ser retirado gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em conjunto com lubrificante à base de água.

10

FAKE

Ao praticar sexo desprotegido (e também em casos de machucados com materiais perfurantes/cortantes possivelmente contaminados com alguma IST), a pessoa deve ir ao CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento). Lá, são oferecidas testagem rápida para o HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C, a profilaxia pós-exposição sexual (PEP) e diagnóstico e tratamento das outras ISTs.

O PEP é composto por remédios que podem diminuir a possibilidade de infecção de alguma IST após o contato com ela, portanto é uma medida de prevenção de urgência oferecida gratuitamente pelo SUS.

11

FAKE

Transar sem camisinha com uma parceria fixa não previne a infecção por IST's, o que previne as infecções é o uso de camisinha e estratégias de prevenção combinada. Transar sem camisinha é sempre um fator de risco. Além disso, é preciso levar em conta o grau de fidelidade presente nessa parceria.

12

FAKE

O uso da Profilaxia Pré-Exposição (PreP) é uma estratégia de prevenção efetiva contra a contaminação por HIV. A pessoa usuária do PreP ainda fica exposta à outras infecções como Sífilis e Hepatites, por exemplo, para as quais o uso de camisinha continua sendo a prevenção mais eficaz e indicada.



FATO ou FAKE?



13

FAKE

Os agentes que causam as IST's (vírus e bactérias) apresentam como característica baixa resistência ao contato com o ar, por isso o contato da pele com superfícies não é um meio de contágio.

14

FATO

O sexo sem lubrificante aumenta o atrito genital, podendo gerar microfissuras, o que aumenta a chance de infecção de ISTs. - O gel lubrificante (à base de água) associado ao preservativo, atua na prevenção da transmissão sexual do HIV, pois diminui o atrito e a possibilidade de provocar microlesões nas mucosas genitais e anais, que funcionam como porta de entrada para o HIV e outras IST. (UNAIDS)

15

FATO

Mesmo quando ocorre de forma esporádica, o uso de álcool e outras drogas pode representar um fator de risco para agravos à saúde, principalmente pela via sexual, pois muitas vezes leva ao relaxamento em relação aos métodos de prevenção (Min. da Saúde -2017).

16

FAKE

Quando o coito interrompido é praticado sem camisinha, ele não previne as ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) nem previne que eventual esperma contido no líquido pré-ejaculatório possa fecundar um óvulo.



	FATO	FAKE	Pontuação da rodada	Pontuação acumulada
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

FATO
FAKE